

## 一、绿化日常养护方法

### 1、 浇水作业

植物生长离不开水，但各种植物对水的需要量不同，不同的季节对水的需要量不同，所以要根据具体情况灵活掌握，做好浇水工作。

#### A、 根据气候条件决定浇水量

a) 在阴雨连绵的天气，空气湿度大，可不浇水；

b) 夏季阳光猛烈，气温高，水分蒸发快，消耗水分较多应增加浇水次数和分量；

c) 入秋后光照减弱，水分蒸发少，可少浇水；

d) 半荫环境可浇水。

#### B、根据品种或生长期来决定浇水量

a) 旱生植物需要水分多，深根性植物旱性强可少浇水；

b) 荫生植物需要水分多，浅根性植物不耐旱，要多浇水；

c) 生长期长的植物生长缓慢，需要水分少，可少浇水或不浇水。

上述浇水量和浇水次数确实的原则是：以水分浸润根系，分布层和保持土壤确湿润为宜，如果土壤水分过多，土壤透气性差，会抑制根系的生长。

### 2、施肥作业

园林绿地栽植的树木花草种类繁多，在观花、观叶、观姿、观果等植物，又有乔木、灌木之分，对养分的要求也不同。

A、行道树、遮荫树，以观枝叶、观姿为主，可施氮肥，促进生长旺盛，枝叶繁茂，叶色浓绿；

B、观花观果植物，花前施氮肥为主，以促进枝叶生长，为开花打基础；

C、花芽形成，施磷钾肥，其中以磷为主；

D、树木生长旺盛期，需要较多的养分，氮磷钾肥都需要，但还是以施氮肥为主；树木生长后期应施磷钾肥，以促进枝条，组织木质而安全越冬；

E、肥料分为无机肥和有机肥料两种。堆肥厩肥，人粪是有机肥，迟效肥。化学肥料属无机肥，速效肥。少用或不用于施肥。速效肥料易被根系吸收，常用作追肥使用，在需要施用前几天施用。迟效肥，放入土壤后，需要经过一段时间，才能被根系吸收，须提前两至三个月施用。

### 3、整形、修剪作业

整形修剪是园林栽培过程中一项重要的养护措施，树木的形态、观赏效果、生长开花的结果等方面，都需要通过整形修剪来解决或调节。

树木修剪要根据树木的习性 & 生长势而定，主干强的宜保留主干，采用塔形、圆锥整形；主干长势弱的，易形成丛树冠，可修成圆球形、半圆球形或自然开心形，此处应考虑栽植地环境组景的需要。

整形修剪的方式很多，应根据树木分枝的习性，观赏功能的需要，以及自然条件等因素来考虑。

#### A、整形修剪方式

a) 自然式修剪：各种树木都有一定的树形，保持树木原有的自

然生长状态，能体现园林的自然美，称为自然修剪；

b) 人工式修剪：按照园林观赏的需要，将树冠剪成各种特定的形式，如多层式、螺旋式、半圆式或倒圆式，单干、双干、曲干、悬垂等。

c) 自然式和人工混合式：在树冠自然式的基础上加以人工塑造，以符合人们观赏的需要，如杯状、开心形、头状形、丛生状等。

#### B、整形修剪时间

a) 休眠期修剪：落叶树种，从落叶开始至春季萌发前修剪，称为休眠期修剪或冬季修剪。这段时间树木生长停滞，树木内养分大部分回归根部，修剪后营养损失最少，且伤口不易被细菌感染腐烂，对权限生长影响最小：

b) 生长期修剪：在生长期内进行修剪，称为生长期修剪或夏季修剪，常绿树没有明显的休眠期，冬季修剪伤口不易愈合。易受冻害，故一般在夏季修剪。

#### 4、除草、松土作业

除草是将树冠下（绿化带）非人为种植的草类清除，面积大小根据需求而定。以减少草树争夺土壤中的水分、养分，有利于树木生长；同时除草可减少病虫害发生，消除了病虫害潜伏机会。松土是把土壤表面松动，使之疏松透气，达到保水、透气、增湿的目的。

#### 5、防治病虫害作业

药剂防治是防治病虫害的主要措施，科学用药是提高防治效果的重要保证；

a) 对症下药：根据防治的对象，药剂性能和使用方法，对症下药进行有效地防治；

b) 适时施药：注意观察和掌握病虫害的规律，适时施药，以取得良好的防治效果；

c) 交替用药：长期使用单一药剂，容易引起病虫害的抗药性，从而降低防治效果，因而各种类型的药要交替使用；

d) 安全用药：严格掌握各种药剂的使用浓度，控制用药量，防止产生药害。

## 二、绿化日常养护要求

A. 同一品种的花卉集中培育，不要乱摆乱放；

B. 要会清阳性植物各阴性植物。阳性植物可以终日曝晒，而阴性植物只能在早晨傍晚接受阳光照射。

C. 根据盆栽花卉的植株大小，高矮和长势的优劣分别放置采取不同的措施进行管理；

D. 不同的花木用不同的淋水具淋水；刚播下的种和幼苗用细孔淋，中苗用粗孔壶淋，大的木质化的用管套水龙头淋，淋水时要注意保护花木，避免冲倒冲斜植株，冲走盆泥；

E. 淋水量要根据季节、天气、花卉品种而定。夏季多淋、晴天多淋、阴天少淋、雨天不淋，潮湿天气少淋或不淋。抗旱性强的品种少淋，喜湿性的品种多淋；

F. 除草要及时，做到“除早、除小、除了”，不要让未来草挤压花卉，同花卉争光、争水、争肥。树丛下、绿化带里、草坪上的杂

草每半个月除一次，花圃内的杂草每星期除一次，花盆内的杂草每三天除一次，并且要清除干净；

G. 结合除草进行松土和施肥，施肥要遵循“勤施、薄施”的原则，避免肥料过高造成肥害。花木每季松土和施肥一次，施肥视植株的大小，每株穴施复合肥四百至八百克，施后覆土淋水；

H. 草坪要经常轧剪，每月须轧剪一次，每亩撒施复合肥五至十千克，施肥后淋水或雨后施用；

I. 绿化带和两米以下花木，每半年修枝整形一次；

J. 保持花卉正常生长与叶子清洁，每星期揩拭叶上灰尘一次；

K. 发现病虫害要及时采取有效措施防治，不要让其蔓延扩大。喷药时在没在掌握适度的药剂浓度前，要先行小量喷施试验后，才可大量施用，既做到除病灭虫又保证花卉生长不受害。喷药时要按规程进行，保证人和花的安全；

L. 绿化带每三天杀虫一次；花圃、花盆、花坛每半月杀虫一次；树木、草坪每月杀虫一次。

### 三、绿化美化达标标准

#### A、花圃要求

a) 地面：无杂草、无脏物、无杂物、通道干净畅通；

b) 花盆：同一品种花卉、树木堆放集中整齐，阳性植物和阴性植物分别堆放，盆内无杂草和杂物，叶面无黄叶和大面积虫斑。空花盆按大小集中堆放，盆内不允许有土无苗或死株；

c) 农药、材料、工具集中摆放。

## B、外围要求

a) 树木：树上无枯枝、枯叶，造型独特，地面四周无杂草各脏杂物；

b) 绿化带：修剪整齐，高矮一致，种植稠密，无枯枝无黄叶，无大面虫斑，地面无杂草和杂物 ‘

c) 草坪：修剪整齐，高度在五厘米以下，种植稠密，无大面枯死，草坪内无杂草和脏杂物；

d) 树盆：修剪及时，高矮一致，无枯枝无黄叶，盆内无杂草和脏物，摆放整齐；

e) 花坛：修剪整齐，高矮一致，无枯枝无黄叶，坛内无杂草和脏杂物，坛内草坪修剪整齐，高度在五厘米以下，种植物稠密，无大面枯死；

f) 花盆：堆放整齐，造型别致，层次分明，叶面无黄叶，盆内无杂草和杂物，盆内不允许有土无苗或死株。